Le diabète de type 1 (15%)

• Signes d'alerte :

polydipsie, polyphagie, polyurie, amaigrissement

• Dépistage / diagnostic :

Hyperglycémie à jeun $> 1.26\text{g/L}$ à deux reprises

Hyperglycémie $> 2\text{g/L}$ (2h après ingestion de Glc, cf ex hyperglycémie provoquée)

Hyperlipidémie

Hypoinsulinémie

Glycosurie (cf bandelettes réactives)

• Origine

Absence de cellules β dans les îlots de Langerhans $\rightarrow$ pas ou très peu de sécrétion d'insuline (**DIABETE INSULINO-DEPENDANT = DID**) $\rightarrow$ hyperglycémie

Absence de cellules β car détruites par le système immunitaire = maladie auto-immune.

Apparition très tôt dans la vie (**DIABETE JUVENILE**)

• Traitement : INSULINOTHERAPIE

▪ par injection 2 à 4 fois par jour après estimation de la glycémie

Choix du moment de l'injection important (après un repas généralement).

Attention à la surdose ou à l'injection avant de faire du sport $\rightarrow$ hypoglycémie $\rightarrow$ pâleur, suées, céphalées voire coma appelé ici coma diabétique.

▪ par pompe à insuline (change le cathéter tous les 2 à 3 jours)

▪ en cours de mise en place greffe de pancréas ou îlots de Langerhans

• Conséquences et complications en cas d'absence de traitement

- hyperglycémie > 8,4 mmol/L → glycosurie → baisse de la réabsorption de l'eau au niveau rénal → polyurie → déficit hydrique dans l'organisme (déshydratation) → polydipsie
- hyperglycémie
 - lésions nerveuses
 - lésions vasculaires sur :
 - des gros vaisseaux (macro-angiopathie) → athérosclérose
 - des petits vaisseaux (micro-angiopathie)
 - au niveau de l'œil → cécité (examen de fond d'œil)
 - au niveau des rein → infection
 - au niveau des pieds → amputation
- le glucose stagne dans les vaisseaux et n'est pas disponible pour les organes qui doivent trouver une autre source d'énergie :
 - protéolyse musculaire → amyotrophie → amaigrissement (**DIABETE MAIGRE**) → asthénie, hypothermie et polyphagie
 - lipolyse dans le tissu adipeux
 - amaigrissement
 - production de corps cétoniques (= troubles métaboliques) → polypnée et halitose → acidose → nausées, vomissements, coma acido cétonique

• Prévention

Apport alimentaire particulier : éviter les sucres rapides
Favoriser la pratique sportive qui baisse la glycémie

Artère saine

Athérosclérose

Le diabète de type 2 (85%)

• Signes d'alerte :

AUCUN = ASYMPTOMATIQUE !

Découverte le plus souvent à cause d'une complication

• Epidémiologie :

Public touché : âgés (**DIABETE DE LA MATURETE**), en surpoids (**DIABETE GRAS**), sédentaire, prédisposition génétique

• Origine :

Cellules β et cellules cibles trop sollicitées

→ baisse de la sécrétion d'insuline

→ résistance des récepteurs membranaires

(DIABETE NON INSULINO DEPENDANT)

● Conséquences et complications en cas d'absence de traitement :

Les mêmes que pour le diabète de type 1

→ hyperglycémie

→ glycosurie → polyurie → polydipsie

→ lésions vasculaires

→ lésions nerveuses

● Traitement :

▪ Mesures hygiéno-diététiques :

alimentation équilibrée (baisse de l'apport lipidique et en sucres rapides)

▪ Traitement des conséquences :

Laser pour limiter la rétinopathie

Antihypertenseur

▪ Activité physique pour faire baisser la glycémie

Si pas efficace au bout de 3 mois → hypoglycémiant oraux voire injection d'insuline

● Prévention :

Public à risque : obèse, diabète gestationnel, diabète de type 2 familial

→ examens paracliniques à effectuer régulièrement (glycémie)

Type de diabète	DIABETE DE TYPE 1	DIABETE DE TYPE 2
Origine		
Signes cliniques		
LE signe paraclinique commun		
Conséquences en cas d'absence de traitement		
Traitement		